

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四百五
六

詳校官太醫院八品吏目臣黃 發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆 瑒

校對官中書臣李斯咏

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷四百五

明

周王朱橚 撰

嬰孩諸瘡腫毒門

癰疽

附論

夫癰疽瘡癰癰癰結核疥癩毒腫赤遊癰疹火瘡等皆由風邪客搏經絡澁滯經曰五臟不和九竅不通六腑不和流結為癰或積毒熱氣不得宣行入於皮膚或發頭面或發虛處無故身熱微覺增寒或有痛處按之必熱

乃癰癤欲發也其有火瘰立名多端乃古人強為之名
大抵治法同一理 母患血熱兒在胎中受之其血亦
熱母患氣壅兒在胎中受之其氣亦壅初生受母熱血
壅氣聚在經絡臟腑之間積滯不散久則成毒毒氣相
交內不通利即從外消外無能消其血與氣壅在一處
則是生背贅或脊督脉腫大如拳紅赤似血其兒之體
是一塊腐血又加生一塊壅毒卒未能消醫有何法善
術之士俾勞以鍼灸熨炳取次攻之十不得一外傳用

朴硝天南星當歸秋芙蓉葉黃蜀葵花乳香木鱉子無
名異其癰已熟即研白丁香少許津唾調傅菜豆大良
久破潰膿血迸出宜先與服托裏排膿消毒散血藥用
生甘草瓜蒌根苦桔梗枳殼川當歸錦頭漏蘆好大黃
等分為末服一錢匕煎熱為服以利為度克効萬一不
可荒亂意欲速消以惡毒草藥致難保 小兒因五臟
不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於膚肉遂生疽腫其狀腫
結皮強上如牛領然疼熾堅癢深附筋骨既得膿後其

疽可愈更須用排膿換肌之藥若餘毒未去封斂稍疾則源流復至或痒或痛肌汁不斷瘡竅不得合矣 陳氏子四歲忽二月患核內塊五六枚不赤不腫亦不疼痛大小如鷄鴨子皮不實硬從肉內透起召愚視之曰素問云榮衛不從逆於肉裏乃生癰腫此因疳成癰癰惡核也寶鑑云惡核而肉裏頻生癰癰而頂邊暗長萬金丸大黃丸治無辜疳癰癰惡核愚曰此病不可治通真子云核塊結實經久不破破則膿潰經久不合

者肉死不治且謾與藥和肌兼用外醫膏藥貼治月
餘無効覺微軟內有自破者有開破者膿潰不止經兩
月瘡口不合或一日發熱與四順飲大黃丸并涼肌
藥鎮驚藥熱除尚有進退雖飲食如舊日漸黃瘦主
人曰服藥已多日何効遲遲如此愚曰藥非無効也
病有終身不除者也藥非無驗也病有決不可救者
也此病決不治後七月間忽傷食吐數口神昏不省
因驚而卒核塊之有惡者如此後之學者不可不知

也

方

五香丸 治小兒癰疽瘡毒未破或膿未潰增寒壯熱

木香一分沉香剉蘇合香研各三合麝香研半分犀角鎔二兩

大黃生剉一兩半吳藍葉二兩梔子仁二兩熟乾地黃二兩白

芍藥一兩雞舌香二人參一兩去蘆頭白茯苓一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎

黃耆湯食前服

木香散 治小兒熱毒疽腫及赤白諸丹毒腫或生瘰

癰瘡癰身中風疹癢痒

木香

一分

薰陸香

一分

鷄骨香

一分

黃芩

一分

麻黃

一分

根節去

連翹

半兩

海藻

半兩

洗去鹹味

射干

半兩

川升麻

半兩

枳實

半兩

麩炒

微

黃牛蒡子

半兩

微炒

川大黃

二兩

剉碎

微炒

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹

漚半合更煎三兩沸量兒大小不計時分減溫服

五香湯 治小兒一切癰疽腫毒瘡癰瘰癧癰疹火瘰

赤遊等疾

連翹 木香 沉香 薰陸香即乳香 射干 升麻

獨活 桑寄生 通草 麝香 丁香各一兩 大黃

兩半

右咬咀三歲用一錢煎汁去滓服

藍葉湯

治小兒疽瘡 方見本門癰瘡類

五香連翹湯 治小兒熱毒腫色白或惡核癰癰附骨

癰疽節解不舉白丹走徧身中疹癢 方見本門毒腫類

治小兒大腸頭惡癰熱瘡 用蜚蜋白擣汁傳其上

即安或燒為末醋和塗數過先以鹽水洗之妙

犀角知母湯 治小兒癰疽

犀角

鎔

知母

焙

黃耆

剉

黃芩

去黑心

人參

丹參

葛根

剉

大黃

剉炒

甘草

炙各一兩

元參

三分

麥門冬

去心焙一兩半

右麤搗篩每服一錢匕水半盞入生地黄汁半合同

煎至四分去滓食後臨卧溫服量兒大小加減

漏蘆湯

治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癰

漏蘆

連翹

肘後用
白薇

白飲

芒硝

肘後用
芍藥

甘草

各六

錄

大黃

一兩

升麻

一兩

枳實

一方
不用

麻黃

黃芩

各九
錄

聖惠方有赤芍藥

二分

右咬咀以水一升半煎取五合兒生七日内取一合
分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至
二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分
三服三十日至四十日取五合分三服肘後治大人
各用二兩以水一斗煮取三升分三服其丹毒須針

錢去血 經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分

黃耆湯 治小兒癰疽瘡癰腫毒

黃耆 連翹 升麻 惡實炒各半兩 元參 丹參

露蜂房 枳殼去穢 甘草炙各一分

右麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後
臨卧溫服小大加減

木通湯 治小兒疽

木通 升麻 赤芍藥 黃芩去黑心 山梔子仁

麥門冬

去心焙各二兩

大黃

剉炒各一兩

枳殼

去穢炒半兩

右麤搗篩每二錢匕水一盞入生地黄汁半合煎至七分去滓分溫二服食後臨卧服量兒大小加減

治小兒疽癰

丹砂

大黃

各十銖

雄黃

簡茹

漆頭者各二十四枚

礬石

馬齒

者十銖

雌黃

二十銖

莽草

十八銖

黃連

三十銖

右咬咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸藥末攪凝傳

黃耆湯

治小兒瘡腫癰疽

黃耆

剉

葛根

剉

麥門冬

去心焙

黃芩

去黑心

犀角

鎔

升

麻

甘草

炙各一兩

木香

半兩

右搗篩每服一錢匕水七分煎四分去滓食後服量

兒大小加減服之

黃耆散

治小兒疽腫及瘡癰身體壯熱口乾心躁

黃耆

剉半兩

連翹

半兩

川升麻

半兩

元丹

一分

丹參

一分 露蜂

房

一分 枳實

半兩

微黃去核

甘草

一分

微赤剉

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫
量兒大小加減服之

犀角散 治小兒疽毒腫硬壯熱大渴

犀角屑

三分

芎藭根

半兩剉

麥門冬

一兩去心焙

川升麻

半兩

香

半兩

黃耆

半兩剉

黃芩

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫

量兒大小分減服之

鷄舌散 治小兒疽瘡

鷄舌香

一兩

木香

一兩

沉香

一兩

麻黃

海藻

洗去鹹

大黃

炮各
半兩

右搗羅為麝散每服一大錢水一大盞竹瀝三兩點煎至五分去滓溫服兼放令溫熱淋渫患處

清水膏 治小兒疽腫毒堅硬疼痛攻衝四畔煖赤宜用抽熱毒消腫氣

羊桃根

一兩

川大黃

一兩

生用

黃芩

半兩

赤小豆

半合

藥

半兩

葶苈粉

半兩

右羅為散用葶藶葉搗取自然汁以蜜少許相調藥
令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻攤可
厚一錢貼之乾即換之

天烏散 貼方

南星 赤小豆 草烏 黃栢

各等分

右為末生薑自然汁貼患處或用米醋調尤佳

治發背癰疽

羌活

一兩為末

麝香

少許

川山甲

醋炒焦半兩

生龍骨

煨存性半兩

右件煎麻黃薄荷酒調如陰瘡頭平向者服之即突
其功效不可具述若小兒痘瘡黑陷者只一服而起
萬不失一

龍角散 治小兒癰疽腫癰一切等瘡或於頭面或發

虛處無故身熱微覺增寒或有疼處皆癰癰證也

地龍

去土
一兩

荊芥穗

一兩
甘草

角刺

三兩潤者杵去
骨用皮濕秤

右為末每服一錢酒水合半盞煎至三分去滓調入
乳香末半錢加減服

又方

忍冬草 甘草 大黃

各等分

右為末依前法煎調乳香末服之

黃連散 治小兒痘已潰

黃連

半兩
去須

黃蘗

半兩
剉

白芷

半兩

右搗為散每用鷄子白調塗於故細布上貼之

又方

白芷

半兩

黃連

半兩
去須

地榆

半兩
剉

白歛

半兩

右羅為散每用鷄子白調塗於故細布上貼瘡日三四度換之良

蜜陀僧散 治小兒疽腫穴後及惡瘡膿水雖淨肌肉不生

蜜陀僧 一兩 黃連 三分 檳榔 三分

右羅為散用糝瘡上日三用之

治小兒疽腫硬已成膿未成膿貼瘡方

鹿角屑 二兩

白飲 一兩

麝理黃石

三兩燒赤以酒淬九遍

右羅為散以醋調稀稠得所厚塗之乾即更塗五七度即効

松脂餅子 治小兒疽瘡久不瘥

松脂一兩 薰陸香一兩

右合研內少許鹽為餅子貼於瘡上汁出盡即差

治小兒癰疽癰毒未破或膿未潰增寒壯熱 用乾蝦蟆一箇燒灰細研以猪脂和傅之

又方

用敗布不以多少燒灰細研以豬脂和傅之

備急神驗方 治未結之初微有紅頭癰子起隱疼者

急用不語唾夜半頻頻塗之即消散飲了酒不可用

若已結成常用

治小兒疽腫結硬已成膿貼燭方 用蛇蛻皮貼之經

宿自消

又方

用商陸爛搗傅之

又方

用芫花搗羅為末水和如膏塗之

又方

用蟬蟪研塗之鰻鱧魚膽汁及血各用塗之並効

癰瘡

附論

夫小兒六腑不和寒氣客於皮膚搏於血脉壅遏不通稽留於經絡之間結腫而成癰其狀腫上皮薄而澤是也熱氣乘之熱勝於寒熱盛則致血肉腐化為膿若膿

潰之後其瘡不瘥故曰癰瘡也

方

黃芩湯 治小兒癰瘡煩熱疼痛

黃芩

去黑心

梔子仁

元參

升麻

大黃

劉黃耆炒

劉連翹

藍葉

甘草

芎藭

木香

犀角屑

右廩搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服
量兒大小加減

吳藍葉散

治小兒肺熱毒攻於諸處生癰瘡及項腋

下有結核煩熱疼痛不得睡卧

吳藍葉

半兩

黃芩

一分

大青

一分

犀角屑

半兩

元參

半兩

川升

麻

半兩

梔子仁

半兩

川大黃

三分

到碎微炒

黃芩

半兩

到連翹子

半兩

甘草

半兩

右為散每服半錢水一小盞煎至五分去滓量兒大小不計時分溫服

黃耆散

治小兒癰瘡膿潰數日不止致體虛煩熱頭

疼昏悶宜服

黃耆

半兩到

防風

半兩去蘆頭

川升麻

半兩

羚羊角屑

半兩

第一

甘草

半兩

地骨皮

半兩

人參

半兩去蘆頭

白茯苓

半兩

膏

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒

大小不計時候分減溫服

犀角散 治小兒癰腫成瘡臟腑壅滯

犀角屑

半兩

麥門冬

三分去心焙

元參

半兩

赤芍藥

半兩

兩

葳蕤

半兩

川升麻

半兩

甘草

一分

紅雪

半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹瀝
半合更煎一兩沸服一方無紅雪入硝石末一字煎
鎔去滓溫服量兒大小加減

麥門冬散 治小兒癰瘡膿水出不盡心中煩悶不已

麥門冬

三分去心焙

紫葛

半兩

黃耆

半兩

川升麻

半兩

犀角屑

半兩甘草

半兩炙微赤剉

木通

半兩

右羅為散每服半錢水一小盞煎至五分去滓量兒
大小不計時候溫服

大黃散

治小兒癰瘡臟腑壅熱心神煩躁大小便不利

大黃

剉各半兩

升麻

梔子仁

朴硝

剉研

枳殼

去穢炒

黃耆

剉各半兩

右麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服

量兒大小加減

連翹散

治小兒癰癤等瘡

連翹

一兩

沉香

半兩

白欬

一分

朴硝

一分

川大黃

一兩

甘草

一兩

一兩

右搗羅為細末每服一錢水一盞炒麝香一錢煎至五分食後溫服

大麻仁丸

大麻仁

二兩

木香

半兩

枳殼

半兩

微黃去穢

牛蒡子

一兩

微炒甘

草

半兩

微赤剉

川大黃

一兩

剉

右為末煉蜜丸如菉荳大每以熱水下十圓取利為度更量兒大小加減服之

黃蘗散

治小兒一切癰腫毒諸風神驗

黃蘗

去粗皮
蜜炙

鬱金

各一兩

陳橘皮

湯浸去
白炒

人參

葛

根

剉各
半兩

右搗羅為末用溫水調下半錢匕量兒大小加減日兩
三服

大黃散

治小兒癰瘡臟腑壅熱太過心神煩悶大小

便不通

川大黃

半兩剉
微炒

川升麻

半兩

梔子仁

一分

川朴硝

半兩

葵

子

半兩

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服
以利為度量兒大小加減服之

益母散 治癰癤皆可用

益母草

二兩
燒灰

鹽花

一兩
炒乾

伏龍肝

半兩

右研為細末每用一錢新水調稀稠得所旋取塗瘡

口上

消毒散 治小兒癰瘡腫毒熱赤

川大黃

三分
生剉

杏仁

三分
皮別研

浸去

鹽花

二分

右羅為散入杏仁以新汲水和稀稠得所旋取塗瘡
腫上乾即易之以効為度

益母草飲 治小兒癰瘡腫痛

用益母草不拘多少洗剉搗取汁每服三二分服
之更量大小加減以滓傳癰上乾則易

又方

用豬腦脂塗紙上貼之乾即易日數徧

又方

用芥子爛研水和塗紙上貼之

又方

用馬齒莧搗傅之

又方

用地龍糞新汲水調塗之一方薄荷汁調塗傅

又方

用姜石末和蒜搗封上

又方

用馬鞭草搗傳之即消

又方

用蕓薹菜搗塗之

又方

用鷄腸草搗爛傳之

又方

用伏龍膽末以好醋調作膏塗於故帛上貼之

又方

用地松爛搗傅之乾即易

又方

用赤小豆末以鷄子白和塗之

又方

用龍葵菜爛搗傅之

又方

用景天草葉爛搗傅之

治小兒癰有膿令潰方

用鷄羽毛七枝燒末服之即潰

又方

用人乳和麝封上至晚膿血出盡

漏蘆散 治小兒癰瘡及丹毒瘡癰

漏蘆分一麻黃去根節

連翹

川升麻

黃芩

各一分

白

欽分三甘草分一

川芒硝分一

川大黃

一兩劉微炒

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五

分去滓量兒大小不計時候分減溫服

外傳朴硝散

天南星 朴硝 乳香 秋芙蓉葉 木鼈子

當歸

無名異

黃蜀葵花

各等分

右為末每服用濁酒傳患處其癰已熟即研白丁香
少許津唾調傅葦苴大其癰自破宜服排膿托裏之
劑

托裏排膿消毒散

大黃 當歸 枳殼 花粉 苦瓜根 錦頭漏

蘆 甘草

各等分

右為末每服一錢熱服如體虛則不可服

腫毒

附論

夫小兒毒腫之候與風腫不殊時令人壯熱其邪毒盛者則入腹令人赤色惡寒心煩悶而嘔逆氣急腹滿有如此狀宜速療之不爾即殺人也

方

五香連翹湯 治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰

癰附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白疹常癢癢

一名五
香散

青木香 薰陸香 鷄舌香 沉香 麻黃黃

苓

各六銖

大黃

二兩

麝香

二銖

連翹

海藻

射干

升

麻

枳實

各半兩

竹瀝

半兩

右咬咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合
兒生百日至二百日一服三合二百日至暮歲一服
五合一方不用麻黃

漏蘆散

治小兒壅熱在臟腑皮膚毒腫或生瘡癰心

神煩躁大小便不利

漏蘆

半兩

白欬

半兩

黃芩

半兩

麻黃

半兩

根節

去

知母

半兩

枳實

半兩 炒微黃

川大黃

半兩

碎微炒

川升麻

半兩

犀角屑

半兩

赤芍

藥

半兩

川芒硝

半兩

甘草

炙微赤

剉半兩

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫

量兒大小不計時候分減服之

犀角散

治小兒毒腫壯熱煩悶

犀角屑

半兩

川大黃

一分兩

露蜂房

一分

川升麻

半兩

門冬

半兩去心焙

連翹

一分

朴硝

一分

牛蒡子

一分微炒

甘草

一分炙微赤剉

枳殼

三分微黃去穢

黃耆

半兩剉

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大小不計時候分減溫服

麝香散

治小兒熱毒腫恐惡毒氣入腹取利以洩其

毒氣

麝香

半兩細研

木香

半兩

沉香

半兩

獨活

半兩

桑寄生

一兩

射干

半
兩 犀角屑

兩

半
兩 川大黃

一兩
剉碎微炒

甘草

半兩
炙微赤剉

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫
量兒大小不計時候分減服之

升麻膏

治小兒諸腫毒

川升麻

二兩

白欬

二兩

漏蘆

二兩

川大黃

一兩

剉碎

川芒硝

二兩

黃芩

二兩

蛇啣草

二兩

蒴藋

四兩

梔子仁

一兩

右細剉用酒浸一宿後以猪脂三斤煎諸藥色焦黃
即膏成以綿濾去滓傾於不津器中於毒腫處塗之

即消

木香散 治小兒熱毒腫貼煖

木香

一兩

紫葛

一兩

紫檀香

一兩

川朴硝

一兩

川升麻

半兩

白欬

半兩

白礬

半兩

燒灰

右搗為散用水調稠麪糊量腫大小貼之日二易之

大黃散 治小兒熱毒腫解風熱腫令內消塗傅之

川大黃

半兩

檳榔

半兩

川芒硝

半兩

黃連

半兩

去須

黃蘗

半兩

小豆

半兩

右羅為末用蜜水調塗患處日三上一方有雄黃半兩細研

治小兒身上毒腫肉色赤熱宜貼燭方

硝石

半兩

川大黃

半兩

菴豆

半兩

右羅為散每使時量腫大小取菴蓬根研汁調塗腫上如有頭即以膏藥當心貼之四畔使散燭之若無菴蓬用鷄子白或以車前根葉代之

治小兒熱毒腫忽發頸項背發即封之不成膿方

生地黄

升一

豆豉

三

川芒硝

五兩

右搗令熟以傅腫上厚二分已來日六七度傅之効

治小兒一切毒腫方

川朴硝

一兩

川大黃

一兩

右羅為散每用冷水調塗於腫處乾即更塗以毒腫消為度

又方

蔓菁根

一兩乾者

藿藿根

一兩乾者

右搗羅為散以鷄子清塗之

又方

商陸

一兩

雲臺葉

一兩

右搗令爛熟貼於腫處頻易之効

大黃散

治小兒風毒

白牽牛

一兩半炒

大黃

三錢

青皮

甘草

朴消

各一錢

右為細末每服一錢砂糖水調下

癰

附論

夫小兒腫結長一寸至二寸名之為癰不似癰熱痛久則膿潰捏膿血盡便差亦是風熱之氣客於皮膚血氣壅結而成凡癰癰捏膿不盡而瘡口便合其惡汁在裏雖差終能更發皆變成癰也

方

犀角九 治小兒熱腫之氣壅外攻皮膚生癰赤腫焮痛或時煩熱少得睡卧

犀角屑

分三升麻

兩半

黃芩

兩半

元參

黃耆

兩半

剉

人

參

半兩去蘆頭

皂莢

一兩去皮塗酥炙令黃焦去子

坐挈

半兩

川大黃

碎微炒

右羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如麻子大每服以生甘草湯下七九量兒大小加減服之

地黃丸

治小兒虛熱消瘡癰

生乾地黃

一兩

桂心

半兩

川大黃

一兩

碎微炒

赤芍藥

半兩

赤

茯苓

半兩

王不留行

半兩

甘草

一分

生用

右羅為末煉蜜丸如菉豆大每服以熟水下七九量

兒大小加減服之

硝石散 治小兒瘡癰初生熱氣始結疼痛妨悶塗之

便令內消

硝石

半兩

紫檀香

半兩

甜葶藶

一分

莽草

一分

川大黃

半兩 白藥

一分

白飲

半兩

右羅為散以漿水和稀稠得所用竹篦子塗於腫上
乾即易之以熱退腫消為度

乳香膏 治小兒軟癰

乳香

半兩

兩賦粉

一分

油

一分

黃蠟

半兩

兩松脂

一分

蜜陀僧

半兩

細研

右先取油煎蠟松脂乳香烱後下粉蜜陀僧調和成膏看癰大小攤膏於故帛上貼之

大黃散

治小兒初生瘡癰五臟壅熱

川大黃

半兩到
碎微炒

梔子仁

一分

黃芩

半兩

川升麻

半兩

甘草

一分
生用

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫
量兒大小分減服之以利為度

治小兒軟癰立効方

百草霜

半兩

鹽花

半兩

黃蘗

一分

乳香

一分

寒食麵

半兩

右羅為散每以醋和塗於故帛上貼之

三物散

治鬢邊生軟癰名髮疽數年不愈者此方妙

猪頸上毛

猫頸上毛

各一撮

鼠屎

一粒

右為末清油調傅或加輕粉尤妙

歛瘡口方

白芨

赤石脂

各一錢研

當歸

三錢去蘆

龍骨

半斤研

許

右為細末乾糝

治小兒軟癰

豆豉

半兩半兩

葱白

七莖細切

右搗作餅子量瘡貼之如瘡大即以大艾炷灸之効
又方

生椒末 麪

伏龍肝

以上各等分

右研為散以醋和封之乾易之効

又方

狗骨頭

炙令黃

雲臺子

等分

右羅為散以醋調傅

又方

石灰

半兩

乾姜

半兩生用

右羅為散以生油和捏作梔子菴在瘡上立差

治小兒軟癰雖出膿水熱痛不止

赤小豆

四十九粒

乳香

半兩分

膩粉

半兩

右羅為散先去膿水後糝散藥於瘡上立効

治小兒軟癰有膿不穴

巴豆

一粒

豆豉

五十粒

葱白

一寸

右同研令爛塗在癰上別以醋麪糊封之

治小兒軟癰赤腫疼痛不可忍

天靈蓋

一枚塗酥炙黃

麻鞋底

一雙多年故者燒灰

右羅為散每使以油調塗之

猪頭散 治軟癰愈而再作者

用野蜂房一二箇燒灰存性以巴豆三七粒去殼煎

清油三二沸去巴豆以油調藥敷立効白礬枯為末

清油調亦効

此藥有驗人以猪頭為謝故名之

又方

用大枳殼一枚去穰令空地上磨令口平以稠麴糊搽四唇露在瘡上自破膿溜出盡更無癰痕

又方

用桑螵蛸燒灰存性以清油調傅

又方

用鷄抱卵殼燒灰存性為末入輕粉少許清油調塗
傳此物難得只以鷄子抱退殼如上法用亦可

治小兒軟癰

用炒油麻從銚中取乘熟嚼吐傳之

又方

用生蒞柿子連皮薄切焙乾為末以少許輕粉三之
一薄薄牛皮膠水調成膏攤帛上貼之先用溫湯洗
淨去膿可一貼而愈

治小兒軟癰焮熱

用半夏末以水調塗之乾即更塗

又方

用葛蔓燒灰細研封之

治小兒癰無頭者

用黍粘葉爛搗傅之

又方

用雀糞細研水調傅之

又方

用葵子一枚以水下之即有頭

錦鱗膏 治小兒軟癰不差

用鯽魚鱗取皮貼軟癰上極妙

癰癰 附論

凡小兒身生熱毒瘡久不差者後則必生癰癰其狀如
作結核在皮肉之間三兩相連癰也是風邪搏於血氣
凝結所生也

方

五香膏 治小兒瘰癧

沉香

半兩

煎香

半兩

木香

半兩

丁香

半兩

麝香

半分

熊膽

一分

蘆薈

一分

黃丹

二分

黃蠟

二分

亂髮

一分

油

半斤

右藥細剉先以慢火煎油令沸下亂髮煎令消即下

諸藥煎三上三下以綿濾去滓下黃蠟次下黃丹麝

香攪勻膏成以瓷合盛每使先以米泔洗拭乾以膏

攤於故帛上貼之

連翹九 治小兒瘰癧發寒熱項頸生結核腫硬如石

腹脇背裏有如堅急不通

連翹

半兩

桑根白皮

半兩 剉

犀角屑

半兩

白頭翁

半兩

漏蘆

半兩 黃蘗

剉 半兩

牛蒡子

半兩 微炒

川大黃

一兩 剉 碎微炒

秦艽

半兩

去苗 川升麻

半兩

右羅為末煉蜜和丸如菰豆大每服以粥飲下五丸
日三服量兒大小加減

犀角散 治小兒瘰癧焮腫疼痛身體熱大腸壅滯小

便赤澀心神煩栗少得眠卧

犀角

銔屑
一兩

惡實

一兩

連翹

二兩

麝香

研一兩

木通

剉一兩

元

參

二兩

沉香

剉一兩

丁香

一兩

朴硝

一兩

兩

右麤搗篩每服二錢匕以水一盞煎至六分去滓分

溫三服早晨日午晚後各一以利為度

木通散

治小兒瘰癧發盛壯熱煩躁坐臥不安

木通

剉一兩

大麻仁

一兩

元參

一兩

川升麻

一兩

敗醬

一兩

連

翹

一兩

川大黃

一兩

碎微炒

川芒硝

一兩

犀角屑

一兩

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒
大小分減溫服當利下惡物筋膜為妙

元參膏 治小兒腦熱結瘰癧連兩耳下腫疼身體寒
熱坐臥不安飲食減少

元參 紫葛 黃藥子 大黃剉炒
今黃 木香 卷柏

芒硝 紫檀香

各一兩

右搗羅為末以鷄子白調稀稠得所調於腫上破時
則去芒硝塗之

麝香散 治小兒腫結久不消散成結癰癰

麝香

一分研

牛黃

一分細研

蝸牛子

一兩炒令微黃

皂莢子

一兩炒微

黃

皂莢針

一兩炙黃

薄荷

一兩乾研

雄鵠糞

一兩微炒

右羅為末煉蜜丸如菉豆大每服以薄荷湯下七丸

日三服量兒大小加減

生肌膏 治小兒瘰癧穴後

黃丹

半兩兩

杏仁

一兩湯浸去皮

蛇蛻皮

一條

黃蠟

半兩兩

亂髮

一兩菜

子油

六兩

皂莢

三寸水浸去黑皮子

右先取杏仁蛇皮皂莢搗碎後以菜油於鉢子中煎
亂髮令消次下杏仁等三味同煎三上三下以綿濾
去滓下黃臘次下黃丹以柳篋子不住手攪令勻候
膏成以瓷器盛於故帛上塗貼之

赤小豆散 治小兒熱毒風腫癰瘰內消

赤小豆 豬牙皂莢炙去黑皮并子黃蘗子 硝石 大

黃劉木鱉子去殼各一兩

右羅為散每用量大小以不語津唾調塗貼惡核用

雞子清調塗患處

妙聖散 治小兒瘰癧不消

綿黃耆

連翹

各一兩

鵲巢

燒灰

川大黃

炒

犀角屑

各半

兩

糯米

半兩用班貓七斤同炒黃不用班貓

右羅為細末每服一錢水八分入酒三二滴同煎五分去滓溫服時時呬

紫檀散

治小兒瘰癧癰核

紫檀香

木香

芒硝

卷柏

各一兩

芍藥

半兩

大黃

半兩

右搗羅為細末每用少許以鷄子白調和得所塗患

處

連翹九 治小兒瘰癧不消去除根本

連翹一兩 元參一兩 糯米半兩 斑猫一分 皂莢針半兩

炙黃川大黃半兩 碎微炒

右羅為末煉蜜丸如麻子大每於空心以生薑湯下
二九當利下惡物為度後喫粥一日補之

生肌散 治小兒瘰癧成瘡有膿水

麝鹽

一分

黃丹

半兩

黃蘗

一分

白礬

一分

瓷瓶盛

以上四味

燒令

研用

通赤細

白欬

一兩

膩粉

一分

右羅為散都研令勻每貼時先用溫鹽漿水洗瘡令

淨拭乾看瘡口大小貼之日一度用

蜜陀僧散 治小兒瘰癧穿潰膿水不止

蜜陀僧

二兩

胡粉

二兩

熊膽

一兩

蘆薈

一兩

白芨

一兩

白欬

一兩

右搗羅為散傳瘡口內効

皂莢丸 治小兒瘰癧難消

皂角

八兩不艸者水浸一宿去黑皮塗酥炙令黃焦

薄荷

五兩

荊芥

五兩

雄黃

半兩
細研

麝香

一分
細研

右羅為末都研令勻用白羊肉四兩去筋膜細切以煉成蜜相和搗三五百杵丸如菉豆大每服以薄荷湯下十九量兒大小加減

四味大黃飲子

治風熱毒氣與血相搏結成核生於

項下頸上遇風寒所折不消成瘰癧久而潰膿成瘡

大黃 甘草 當歸 赤芍藥

右等分咬咀水煎去滓大小以意加減食後服忌毒物

膩粉散 治小兒瘰癧除根本

膩粉

一分

黃耆

一分

班猫

二七枚去翅足糯米拌炒微黃

糯米

二

粒

右羅為散每服空腹以溫酒調下一字良久喫少許醋湯病隨小便中出量兒大小加減服之

治小兒瘰癧已結成外貼自出

水銀

一分手心內用津研如泥

粉霜

一分

砒霜

一分

燕子糞

一分

班貓

一分用糯米同炒令黃去翅足用

右研令勻用臘月猪脂調和得所取一小豆大安在
癰子上以消腫膏貼之六七日當有穴膿水出半月
其癰子自出得以生肌膏貼之取差

班貓膏

治小兒瘰癧不穴

班貓

二枚去翅足

松脂

三兩

巴豆

十枚去皮心以漿水煮過與班貓研令細

雀

糞

一兩
為末

右先取松脂入銚子內鎔化入班貓已豆熬成膏捏作餅子熱貼在瘰癧上候穴用生肌膏貼之日再換差為度

貼散瘰癧神効方

白膠香

海螵蛸

各等分

真降香

用

右為細末摻患處外以水紙掩之一夜而進

班貓丸 治小兒久患瘰癧子未破者取下

班貓

七枚蛤粉炒去頭足

淡豉

七粒

輕粉

一錢

右為末津唾九小豆大十歲十五九空心櫛皮煎汁下至夜取如鴨子核如未全退十日後更取之又方治久新癰子草烏頭末井水調塗自消已破者淨洗先以膏藥貼瘡口後以藥塗十數次即差如小便澁以滑石末半錢燈心湯調下

追毒班貓膏

治小兒癰癰結核久不差

班貓

二枚去翅足及頭炒

巴豆

二十枚去心漿水煮

松脂

三分

右先研二味為粉次入松脂鎔化攪令勻更搗一二百杵作餅熱貼在瘰癧上藥力盡別換以差為度

蝸牛丸 治小兒瘰癧內消

蝸牛子

一百二十枚
活者去殼

薄荷末

兩

丁香末

半兩

右入乳鉢內同研為丸如菉豆大每日空心以薄荷湯下五丸晚再量兒大小加減

硃砂丸 治小兒瘰癧連綴如梅李核狀

硃砂

砒霜

各一兩

右研如粉用糯米飯為劑熬如小麥粒大有患者即
烙破內一九五日一換後用生肌膏

麝香散 治小兒瘰癧

麝香

研一分
一 鴿糞炒三遍
秤一兩

右件再同研如粉每服半錢酒調下日三服早晨晚
後各一量兒大小加減

治小兒瘰癧結硬令內消方

膩粉半
兩 鷄子

三枚取
白用

右件和調如稀麪糊以文火炒之用火筋急攪勿令
粘着銚子候焦黑色即住入上好硃砂半兩同研如
麪每服以粥飲調下半錢五更與服良久腹疼便瀉
出病根棗核之狀如未差即隔日再服之若已成瘡
者宜用後散貼之

又方

毒蛇皮

條三

吳茱萸

半合

右燒為散研以生油調塗之須用帛子遮藥氣不得

衝眼切須忌之

蝸牛散 治小兒瘰癧

蝸牛殼

一兩半 真牛乳半升

右件入銚中於慢火上熬令乳盡取蝸牛殼研如粉
入大黃末一分更研令細每服以皂莢子仁湯下半
錢大小便中利出惡物即差

又方

用皂莢子四十九枚用手指大竹筒安得皂莢子壘

在竹筒中緊塞竹筒口投在溷坑中浸四十九日取出洗淨曝乾搗羅為散每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減

又方

用白花蛇五兩以酥塗炙令黃焦色搗羅為散每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減

又方

用白僵蚕炒搗羅為散每服以溫水調下半錢日三

服量兒大小加減

治小兒頸生瘰癧榆皮傳方

用榆白皮爛搗如泥封頸上頻易

治小兒瘰癧鉛丹塗方

用鉛丹三兩以銚子熬當有脚如黑灰取脚不計多
少更研如粉用面脂調塗以故帛貼數拭患處有惡
汁出拭却更貼半月差內消不作瘡極効

防風丸 治小兒瘰癧結核寒熱一名連翹丸

方見患核類

皂莢刺散

治小兒瘰癧腫硬

用皂莢刺一斤於盆中燒候火盛時取牛蒡子半升撒於火中與皂莢刺都成灰為度待冷放之搗羅為散每服以井花水調下一錢日三服三五日內有惡物下如膠飴狀下盡即永斷根

治小兒瘰癧子寒熱

用苦瓜苗子煮汁服亦生搗絞汁服

治小兒閃癰頭髮豎黃瘰癧羸瘦

用杵林檎末以和醋傅上癰如移處就傅之

惡核 附論

夫小兒惡核者是風毒氣與血氣相搏結成核生頸邊風寒所折遂不消不潰名為惡核也

方

五香散 治小兒受風熱項邊生惡核寒熱腫痛一名

五香連翹湯

方見本門
毒腫類

連翹九 治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結

核瘰癧及心腹脅背裏有堅核不痛名為結風氣腫

連翹

桑白皮

一方用榆白皮

白頭翁

牡丹皮

防風

黃蘗

桂心

香豉

獨活

秦艽

各一兩

海藻

半兩

右為末蜜丸如小豆大三歲兒米飲服五丸至十丸

五歲已上者以意加之聖濟方無桂心名防風丸

丹參散 治小兒風熱項腋下有惡核不消大便多閉

心神煩熱

丹參

半兩

露蜂房

一分

川升麻

半兩

防風

半兩

去蘆連翹

半兩

黃耆半兩 川大黃兩半 甘草兩半 牛蒡子兩半 枳

殼三分 麩炒微黃去穢

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫

量兒大小分減服

元參丸 治小兒胃間積毒風氣不散連項生惡核煩

熱不已

元參兩半 漢防已兩半 羌活兩半 川大黃一兩 木香兩半 梔

子仁兩半 赤芍藥兩半 連翹三分 川升麻兩半 牛蒡子兩半 枳

右羅為末煉蜜九如菴豆大每服以粥飲下五九日
三服量兒大小分減

升麻散 治小兒項生惡核壯熱不止

升麻

半兩射干

半兩連翹

半兩犀角屑

半兩川大黃

半兩微炒

兩川

兩川

朴硝

半兩

右搗羅為散每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫
量兒大小分減服之忌酒麪炙燂

赤小豆散

治小兒毒風腫生惡核令內消

方見本門
癰瘰類

癭氣附論

夫小兒癭氣之狀頸下皮寬內結突起壘然不消長大氣結所成也小兒啼未止因以乳飲之令氣息喘不得消散故結聚成癭也

方

木通散 治小兒癭氣咽喉腫塞妨悶

木通

剉

昆布

洗去鹹味

乾姜

炮裂剉

甘草

隔紙炒令紫色已上各半

兩 羚羊角屑

人參

去蘆頭

海藻

洗去鹹味

射干

檳榔

以上各
一分

右羅為末煉蜜九如麻子大不計時候以溫酒下十
九量兒大小加減

陳橘皮 治小兒瘦氣咽喉噎塞

陳橘皮 湯洗去白穢焙 麥門冬 去心焙 赤茯苓 連翹 海

藻 洗去鹹味 商陸 乾者以上各半兩 杏仁 一分湯浸去皮尖 羊

歷 三枚炙黃 栴榔 三分

右羅為末煉蜜九如菴葶大二三歲以溫水下七九

兒大者綿裹一九如皂莢子大不計時候含燕津

商陸散 治小兒癭氣胃膈噎塞咽膈

商陸

一兩微炙

昆布

一兩洗去鹹味

牛蒡子

三分

射干

木通

剉

海藻

洗去鹹味

羚羊角屑

杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒微黃以上各

半兩

右搗為散每服一錢水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時服量兒大小分減溫服

木通散 治小兒癭氣心胃壅悶咽喉噎塞

木通

海藻

洗去鹹味

昆布

洗去末

松羅

桂心

白欬

以上各半兩

蛤蚧

一兩炙微黃

琥珀

三分

右羅為散每服以牛蒡子煎湯調下半錢不計時候

量兒大小加減

海藻散

治小兒癭氣腫結漸大

海藻

洗去鹹味

海帶

海蛤

昆布

洗去鹹味

木香

以上各半兩

金薄

三十片

羊廩

三枚炙黃

猪廩

三枚炙黃

右羅為散每服以溫酒調下半錢量兒大小加減日

三四服

昆布散 治小兒癭氣腫悶

昆布

洗去鹹味

黃耆

剉

麥門冬

去心焙

川大黃

剉微炒

陳橘

皮

湯浸去白穰以上各半兩

甘草

一分炙微赤剉

杏仁

一分湯浸去皮尖雙人麤炒微

黃

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計

時候量兒大小加減溫服

半夏散 治小兒癭氣心胃煩悶

半夏

湯浸七遍去滑

海藻

洗去鹹味

龍膽

去蘆頭

昆布

去味

土瓜

根射干

小麥麴

以上各一分

右羅為散每服以生姜酒調下半錢日三四服量兒

大小加減服

昆布丹 治小兒癭氣不散

昆布 海藻 草龍膽

甜葶藶

隔紙炒令紫色研各一兩

榔 牽牛子

炒各半兩

右搗羅細末白麴糊和丸如黍米大每服十粒人參

湯下大小加減服

治小兒癭氣咽喉噎塞

昆布

洗去鹹味

海藻

洗去鹹味

訶梨勒皮

木香

一分

川大黃

剉微炒以
上各半兩

枳殼

一分麩炒
微黃去穢

右羅為散末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下
七九量兒大小加減服之

又方

羚羊角屑

昆布

洗去鹹味

桂心

木通

剉以上
各半兩

川大

黃

一兩到
微炒

右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以粥飲下七
九量兒大小臨時加減

又方

檳榔

一兩

海藻

昆布

以上各半兩
洗去鹹味

右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下七
九量兒大小加減服之

又方

羊麝

半兩炙
今黃

青橘皮

半兩湯浸
去白穰焙

燒銀砂

兩

右羅為末用糯米飯和丸如菉豆大不計時候以溫酒下五九量兒大小加減服之

風瘙癰瘡

附論

夫小兒風瘙癰瘡者由風邪客於腠理搏於榮衛傳而為熱熏散肌內溢於皮膚變生癰疹狀如痞乍差乍發痒瘙不時搔之血出其痒不已故名風瘙赤疹者熱白疹者寒治法不可不察

方

蒴藋浴方 治小兒風瘙疹

蒴藋

防風

羊桃根

石南葉

秦椒

一方用秦光

升麻

苦參

茵芋

芫花

一方用芫薊

蒺藜

蛇床

子

枳殼

一方用枳實

礬石

各一兩

右咬咀以漿水三斗煮取一斗去滓內礬令小沸浴之

治瘡毒及嬰孺風疹在皮膚不出者

用景天草生苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁
以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如此用之
治大人小兒風瘙癢疹心煩悶方

用巴豆二兩搥破以水七升以帛染拭之

五參散 治小兒肺風瘙痒癰疹癰疥

人參 紫參 白附子

焙裂各二分

枯藁根

天麻

各半

兩 元參

剉一兩 沙參

剉三分 丹參

右同搗為散五十日至百日兒每服一字二百日至

一歲兒每服一字半，妳汁調下。二歲至三歲，每服半錢。煎薄荷、金銀湯下。或寒湯調下，空心午後各一服。如乳母服一錢，溫酒調下。

麝香犀角丹 治癰疹不差甚者，如癩服之神驗。

犀角屑 烏蛇肉半兩酒浸去皮骨 天麻 白附子 白

僵蚕各半兩微炒以上各搗為細末次入 硃砂 麝香 龍腦各一錢研

右件都研勻，煉蜜和丸如黍米大，每服十粒，煎金銀薄荷湯下。

防風湯 治小兒癰疹風痒

防風

白茯苓

去黑皮

升麻

貝母

去心

蒺藜子

炒去角

大黃

剉炒

甘草

炙剉各一分

右麤搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服食後日二服之

澤蘭湯

治丹及癰疹入腹殺人方

澤蘭

芎藭

附子

茵芋

梔木

莽草

細

辛

各二銖

右咬咀以水三升煮取一升半分四服先與此藥湯
然後作餘治

麻黃散 治小兒風癰癢疹

麻黃

一兩去根節

川升麻

一兩兩 葛根

射干

雞舌香

半兩 甘草

半兩炙微赤剉

石膏

右散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫量
兒大小分減服之

黃耆湯 治小兒風疹壯熱心梟

黃耆

剉

白鮮皮

剉

防風

去蘆各一兩

枳殼

去穢炒黃一兩

黃

苓

去黑心

甘草

炙各一分

右麤搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

食後臨臥各一服量兒大小分減

防風湯

治小兒癭疹瘡疥皆宜服之

防風

一兩

鼠粘子

一兩

荊芥穗

一兩

人參

一兩去蘆

甘草

炙

天

麻

各半兩

右搗羅為末每服一錢水八分入生姜薄荷各少許

煎五分去滓溫服

犀角湯

治小兒風疹壯熱心累

犀角

鎊

升麻

麥門冬

去心焙

茯苓

炒去角

甘草

炙各一分

右咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至五分去滓食後溫服更量兒歲數加減

茵芋湯

治小兒風瘙癢疹心膈煩悶

茵芋

防風

附子

牡蠣

莽草

各半兩

右細剉和勻以水一斗煮取六升去滓看冷暖洗浴

避風一方無苜蓿名莽草湯各用一兩

廣濟療小兒疹浴湯方

柳木空中屑

二升

葫蘆根

切二升

鹽

二合

櫨木

切一升

右切以水二斗煮取一斗入鹽以洗浴頻為之以差止

竹瀝湯 治小兒壯熱癰疹已服湯九不消宜服

淡竹瀝

一升二合

葛根汁

一升五合

牛黃

豆大三顆研

右相和一歲兒服一合五六歲兒服三合至五合以

意增減之

枳實湯 治小兒風疹皮膚腫

枳實

去穢炒
黃兩片

芍藥

一分

右搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓入清酒
半合更煎三五沸分溫二服空心午間晚後各一更
量兒大小加減

石南湯 治小兒風疹皮膚腫

石南葉

一握
蜀椒
去目及閉口者
炒出汗半兩

右以水二盞取一盞半去滓下硝石白礬各半兩攪令消以綿搵塗於疹處乾即易

治大人小兒皮膚風熱身生癰疹

牛蒡子 浮萍

右等分為末薄荷煎湯調二錢服

治小兒風疹出不止塗傅方

景天 一兩一分 慎
火草是也 藍 三兩

右同搗細絞取汁以熱手摩塗之日再

又方

用白礬熬令汁枯研為末酒調用鷄翎掃塗疹上一方熱酒投化以馬尾搵酒塗之

治小兒風癢癰疹瘡癰

用牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差搗末傅亦主骨疽及癰疾瘰癧絕妙一方溫酒調下半錢

治小兒手足及身腫方

用小便溫暖漬之良

又方

用巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿肉
湯中拭病上隨手消并治癰疹又以大戟煎湯淋三
五徧風毒癰疹即消

治小兒患癰疹入腹體腫強而舌乾方

用蕪菁子為末酒服方寸匕日三

又方

用蚕沙三升以水三升煮去滓洗之良亦治丹毒

又方

用車前子為末粉之良

又方

用鹽湯洗了以蓼子按傅之

治癰疹方

用白芷針刺燒存性為末溫酒調下二錢又以根葉煮汁洗之

治風疹亦治風熱皮膚瘙癢因而生瘡方

用赤石脂不拘多少研細每服二錢荊芥茶調下食
後荊芥酒調亦得如氣實用蜜水調亦妙

治癢痒成瘡方

用殭蚕炒黃末酒調服立差

療丹癰疹方

用酪和鹽熟煮以摩之手下消

療五野鷄病小兒患赤疹方

用鰕搗碎傅之

治大人小兒風疹方

用茱萸一升以酒五升煮取一升帛染拭之

治腫毒遊風風疹頭痛方

用芭蕉根并署傳又治丹毒煎汁塗之

土沙散 治小兒風疹進退腫痒

用土砂當歸等分為末冷酒調下一錢兼用塗之又
慎火草生姜及鹽同研擦痒處消

又方

用石灰水醋調塗即消

治小兒風瘙癢疹心中悶亂

右川芒硝二兩以清酒三大盞煎至二盞放溫洗痒處候燥復洗之痒差乃止避風

又方

用虎脂摩之即愈

五香枳實湯 治小兒着風熱瘡癩堅如麻豆粒瘡痒搔之皮剥汁出或徧身頭面年年常發者

青木香

九銖

麝香

六銖

漏蘆

各半兩

升麻

黃芩

白欬

鷄舌香

薰陸香

沉香

防風

秦艽

麻黃

各一兩

枳實

一兩半

大黃

一兩八銖

右咬咀以水五升煮取一升八合兒五六歲者一服
四合七八歲者一服六合十歲至十四五者加大
黃半兩足水為一斗煮取二升半分三服之

枳實丸

治小兒病風瘙痒痛如疥搔之汁出徧身瘡

癰如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細

黃及肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛解體當
風風熱相搏所得也不早治之成大風疾

枳實

一兩

菊花

蛇床子

防風

蒺藜子

白薇

浮萍

各一兩

天雄

麻黃

漏蘆

各半兩

右為末蜜和丸如大豆許五歲兒米飲服十九加至二
十九日二五歲已上者隨意加之兒大者可為散服
治小兒風疹走帶方

姜黃

荊芥

黃連

土硃

赤小豆

爛石膏

等分

右為末撲之

二聖散 治癰疹肌肉青黑

胡粉

一兩 苦參

一兩

右為細末每服一錢溫酒下兼塗患處

消毒飲 如麻風身或熱不熱遍身紅疹如此者是麻

風宜朱砂雄黃等分為末井水調塗後服藥

牛蒡子

炒六兩

荊芥穗

一兩 防風

甘草

炙

升麻

各一兩半

右咬咀水煎食後溫服

又方

用土硃砂酒服并搽之

普濟方卷四百五

欽定四庫全書

普濟方卷四百六

明 周王朱橚 撰

嬰孩諸瘡腫毒門

五色丹毒

附論

夫丹之為候由熱毒之氣搏於榮血而風乘之所以赤
乳肌肉而為之走注也外因乳母食啖熱毒物藥及烘
衣不候冷便與兒服而得之其證或發於手足或生於
頭面胃脇令兒煩悶腹脹其熱如火痛不可言赤腫遊

赤徧體也湯氏所為丹有十五種又有赤遊風及燦瘡
本事方以十種治之然丹不特色赤或青或黃或白或
黑是血熱風毒有盛有衰挾冷挾熱故其色變易又不
同焉要之諸瘡皆屬於心心為血之主血為熱之媒古
人以丹命名蓋謂心應火色尚赤揣本揆元大槩心家
血熱所致風以動之於是遊赤而徧體也蔓衍而不歇
則爛肌自四肢而入腹入腎則殺人惟初生於胃腹然
後流散於四肢者易愈 夫小兒五色丹者由丹發而

變改無常或青黃白黑赤此是風毒之熱有盛有衰或
冷或熱故發為五色丹也赤丹者由風毒之重故使赤
也初發疹起大如連錢小者如麻豆肉上生粟色如鷄
冠故謂之赤丹亦名茱萸丹也白丹者由夾風冷之氣
故使色白也初發痒痛微虛腫如吹妳起不痛不赤而
白也黑丹者由風冷傷於肌肉故令色黑也初發痒痛
或燥腫起微黑色者是也丹發於肉中有赤如丹色大
者如手劇者遍身赤痒故號天火丹丹發於兩脇及腋

下此謂之殃火丹也丹發兩膀上過一日便赤謂之神火丹也丹發赤斑如梅子遍背腹謂之野火丹也丹初發着兩頰兩腋下兩膀上謂之家火丹也丹發如灼在脇下正赤初從頭起而多痛謂之螢火丹也朱田火丹由丹發於背漸至遍身一日一夜而成瘡謂之朱田火丹者是也丹發兩膀裏尻間正赤流至陰頭赤腫血出謂之天竈火丹也丹發從足趺起正赤謂之廢竈火丹也丹發膝上從兩股起及臍間走入陰頭謂之尿竈火

丹也有肌肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣則
皮膚赤而腫起其風隨氣行遊不定故名赤遊腫也
凡患諸丹瘤腫毒必須先服升麻飲之類導氣藥以散
其毒方可用藥調塗不然恐毒氣入腹則殺人也 凡
小兒丹瘤乳腫毒赤走引遍身者乃邪熱之毒在表以
磁片撇出紫血其病立愈如不愈者後用涼膈散加大
黃芒硝利三五行為效次用拔毒散掃三五度必愈矣經
曰丹煉赤瘤火之色也相火主之 凡小兒有赤瘤暴

腫可用牛黃通膈丸瀉之後用陽起石散傅之則腫毒自消如不消可用銚針砭刺血出而愈矣銚風熱發丹古方謂小兒得之最忌以其氣血未定肌膚柔脆無以勝悍毒故也是以諸丹不同其發無定處俗又謂之溜流走經絡散發肌表如塗丹之赤有法可鎌洩去毒氣不爾則毒入腹近心則死但初發於心頭者不可鎌爾

方

藍青散 治丹毒大赤腫身壯熱百治不差

寒水石

銖十六

石膏

銖十三

藍青

銖十二 用乾者冬

犀角

銖八 柴

胡

銖八

知母

銖十

羚羊角

銖六

杏仁

銖八

芍藥

銖各七

黃芩

銖各七

梔子

銖二

竹瀝

升一

生葛汁

四合 澄清

蜜

升二

右㕮咀以水五升并竹瀝煮取三升三合去滓內杏

仁脂合蜜汁微火煎取二升一二歲兒服二合大者

量加之米飲化下

搗湯

治小兒數種丹方

大黃

甘草

當歸

芎藭

白芷

獨活

黃

芩 芍藥 升麻 沉香 青木香 木蘭皮各一

兩 芒硝

右咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝以綿搗揚中適寒溫搗之乾則易取差止

藍葉散 治諸丹發熱赤腫

白芷 柴胡 知母 杏仁去皮 川芎 赤芍藥

生地黃 川升麻 生甘草各一分 乾葛一分 爛石膏

梔子仁各半兩 藍葉日乾一分

右剉細每一錢半新水煎服熱甚加黃芩玄參煎服
藍青散 治一切丹毒赤腫身熱如火已服諸藥不退
由風熱毒氣在於腠理熱毒搏血蒸發於外其皮上
熱而赤如丹塗之狀故謂之丹若久不治則肌肉壞
爛若毒氣入腹則殺人也今以一方同療之

藍青

知母

甘草

梔子

各半兩

黃芩

一兩

杏仁

去皮

尖用半兩

升麻

柴胡

寒水石

石膏

各一兩

赤芍藥

四錢 羚羊角

右咬咀每服三錢水一盞煎六分三次溫服

升麻膏 治小兒一切丹發無常處體熱如火燒

川升麻 川大黃 景天草 蛇銜 梔子仁

寒水石 川芒硝 藍葉 生地黃 芭蕉根

羚羊角屑 梧桐皮

各半兩

右細剉以竹漚浸一宿明日漉出却入鍋中用臘月猪脂一斤於慢火上熬一食久承熱以綿濾去滓候冷成膏以瓦合盛旋取摩之兼以膏如枣核大以竹

瀝調服之

升麻膏 治小兒赤毒腫

川升麻 白欬 漏蘆 川芒硝 各一兩 黃芩 枳

殼 連翹 蛇御 各一兩半 梔子仁 二兩 蒴藋 二兩

右細剉以猪脂一斤入於鐺中以慢火煎諸藥令赤
色去滓放冷以篋合盛旋取塗之

麻黃湯 治小兒丹毒風腫及風疹

麻黃 一兩半 獨活 射干 甘草 桂心 青木香

石膏

黃芩

各一兩

右咬咀以水四升煮取一升三歲兒分為四服日再

升麻黃芩湯 治小兒月內發丹一名藍葉散

升麻

黃芩

去黑心

犀角

鎊

大黃

剉

柴胡

去苗

山梔子

仁

各半兩

石膏

三分

甘草

炙剉一分

藍葉

切二分

右搗篩每服二錢匕水一盞煎至半盞去滓食後分溫二服更量大小加減外臺秘要用竹漚四合同煎治小兒惡毒丹及風疹

麻黃 升麻 葛根 各一兩 射干 鷄舌香 甘草

各半 石膏 兩合

右咬咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日三

治小兒大腹痞滿丹毒寒熱

取即耶根莖煮服之

治小兒衝惡熱毒煩悶及諸熱丹毒

以生銀水磨服功勝紫雪忌生血

內托散

紅內消 當歸 茄片 甘草節 羌活 黃芩

各半
兩 麝香半錢

右為末每服二錢茄蒂煎湯調下或生地黃亦可

金花散 治一切丹毒

鬱金 黃芩 甘草 山梔 大黃 糯米 黃

連

右各一兩生為末蜜和冷水調以鵝毛上患處

淋洗方

防風 桑白皮 黃菊花 丹參 莽草 荊芥

棗木根

等分

右剉煎水避風浴之

大黃散 治小兒一切丹遍身赤痛

川大黃

半兩剉微炒

防風

半兩去蘆

川升麻

一分

黃芩

一分

麻黃

一分去根節

秦艽

一分去苗

川朴硝

三分

右搗羅為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

防已散 治丹腫候熱毒之氣極與血相搏而風乘之
故赤腫及遊走遍體者又名赤遊風入腹入腎則殺
人也

漢防已

半兩

朴硝

犀角

黃芩

黃耆

川升麻

各半錢

右㕮咀每服半錢水一盞加竹葉煎去滓大小以意
加減服之一方加川芎蜜煎

升麻飲 治一切丹遍身壯熱煩渴赤流初發甚者一

名消毒散

升麻

黃芩

大黃

各一錢

麥門冬

去心

葛根

朴硝

各三錢研

右為細末和勻熟水調下半錢一方煎服無葛根量

兒大小加減

黃芩湯

治小兒丹毒偏身

黃芩

去黑心

麻黃

去根節

秦艽

去苗土

升麻

各一兩

大黃

劉

防風

去蘆各半兩

右搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴硝末半錢
匕去滓空心分溫二服晚再服更量兒大小加減

寄生散 治毒腫甚者

桑寄生

獨活

川大黃

各一兩

犀角

朴硝

甘

草

各半兩

右搗羅為末每服一錢煎五分去滓溫服量兒大小

加減

升麻膏 治小兒赤丹初發肉色如硃色如鷄冠又名

茱萸丹

川升麻 白欬 漏蘆 川芒硝 各一兩 連翹 梔

子

各半兩

右剉細以猪脂半斤入鐺中用慢火煎諸藥令赤色去滓放冷以磁合盛旋取每用少許塗患處

升麻湯 治小兒黑丹以此藥搗之

升麻散

二兩

漏蘆

二兩

川芒硝

二兩

黃芩

三兩

梔子仁

一兩

蒴

藿

半兩

右細剉和勻每用三兩以水五升煎至三升去滓微溫以軟帛旋蘸搗病上以消為度

牛黃散 退丹毒

鬱金 甘草_炙 桔梗 天花粉 葛粉

右等分為細末每服一錢薄荷湯入蜜調下

淋洗方

防風 桑白皮 黃菊花 丹參 莽草

右等分加荆芥煎湯浴患處

黃耆湯 治小兒丹毒

黃耆

剉

茯苓

炒去角

黃芩

去黑心

大黃

剉焙

甘草

炙剉各一

分

右搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴硝末半錢
匕去滓食前分溫二服更量兒大小加減

吳藍湯搗方 治小兒發丹毒熱痛

吳藍 大黃 槐白皮 商陸 榆皮

各二兩

右細剉每用二兩以水五升煎至四升去滓入朴硝

半兩攪勻以綿二片浸於湯中更旋搗丹上日三五度即差

祛毒膏 治小兒丹黑色痒痛腫起一名祛毒散

川升麻

漏蘆

芒硝

各二兩

黃芩

一兩

梔子

一兩

右為麤末每用兩匙頭以水三盞煎至二盞去滓微熱以軟帛旋蘸搗瘡上以消為度

治小兒五色丹

川大黃

黃芩

川芒硝

梔子仁

乾藍葉

商陸各一
兩

右羅為散以水調塗之立効

治小兒天竈火丹

薺葉

三分

赤小豆合鍛鑪門上灰

一兩

青羊脂

三兩

白

二莖
切

右相和搗如膏摩之燥再摩之

拔毒散 治小兒丹毒肉色變異或着四肢或在胃背
遊走不定熈熱疼痛拔毒消腫散熱痛

石膏

三兩

甘草

黃蘗

各一兩

寒水石

七兩

右為細末每用水調服時以鷄翎刷掃以芭蕉汁調

尤妙

朱黛散

治解丹熱諸毒

青黛

土硃

各一分

軟滑石

荊芥穗

各半分

右為末每一錢半蜜水調下兼與撲身

寒水石散

治角痺遊走不定焮然赤腫疼痛用藥角

歸手足上為妙

寒水石 石膏 黃連 黃柏

各一兩

右為末水調刷

治小兒野竈丹從膝起薺葉塗方

乾薺葉

末

香薷

末赤小豆

末各半兩

生薺葉

一握細剉

右細研薺葉入諸藥末和調如糊塗乾即易之以差為度

治小兒天竈火丹發尻間正赤流陰頭赤腫血出薺葉
芫塗方

葱

五莖和
須切碎

薺芫

五莖生者
和梗切研

赤小豆

末

竈門上灰

各研

合一

右合研勻細以青羊脂三兩調勻塗之以差為度

治小兒天火丹發徧身赤如絳色痒痛甚者

桑根白皮

二兩

丹參

二兩

甘菊

一兩

莽草

一兩

兩

右細剉和勻每二兩以水三升煎至二升去滓令煖

避風浴兒

棗根湯

治小兒五色丹徧身宜用洗浴丹發而變改

無常

棗木根

四兩

丹參

三兩

乾菊花

二兩半

右細剉煎湯避風冷處浴之次敷藥每用二兩以水

五升去滓

丹毒至効散 治小兒一切丹毒及龍帶發作先服消

毒飲次用傳之

黃丹

錢一朴硝

錢一

赤小豆

兩頭尖者為末半合

右研令勻井水調以鷄毛刷立効

麻黃散 治小兒丹若入腹及下部陰卵百藥不差

麻黃

去根節

升麻

各半兩

硝石

研一兩

右搗羅為散每服半錢匕井花水調下空心日晚各

一

三黃散 貼一切丹腫毒

大黃

黃蘗

宣連

各等分

右為末獺猪膽汁調塗頭心及貼脚心

又方

用硝石白麴等分研勻井水調稀睡時塗腳心効

硝石散

治小兒丹發如灼其初從額起至脇下大痛

者名螢火丹

硝石

半兩寒水石一分赤小豆

合

右搗羅為細末每用半錢以冷水調塗患處一方用

猪脂

莽草散

治小兒丹發從足趺起色正赤乃名癰瘡火

丹

莽草 寒水石

硝石 各半
兩

右搗羅為散每用以新汲水調塗患處一方每服半

錢一日三服量兒大小加減服之

慎火草散 治小兒一切丹通用

慎火草

半兩
紫葛半兩
硝石半兩

右搗羅為散用冷水調塗之乾即再塗以差為度

治小兒黑丹

荒蔚子

蛇啣草

慎火草

各二
兩

右搗令爛以鷄子白調塗之

治小兒天竈火丹

細辛

一兩糯米

一合景天草

三兩

右搗如泥塗丹上差

白玉散 治赤遊丹毒

白玉

一兩寒水石

二兩

右為末米醋調傅貼患處或腫至外腎有破處只用

水調亦可

保嬰方

無白玉用白土如乾上用水鷄翎掃之

治小兒天竈火丹病從髀間起其小兒未滿百日犯行路竈君若熟流下令陰頭赤腫血出方

鯽魚肉

劉五合

赤小豆末

三合

右二味同搗少水和傅之良

姜礬散 治小兒火丹并一切風疹赤腫

生姜

五兩切片子

白礬

二兩半研同上調少時自乾不見火

右為末生姜自然汁調搗毛拂之又方牽牛末薄荷
蜜水調下食後大便利是効

治小兒丹瘤

綿羊腦子

生用朴硝

右調勻貼於瘤上

備急治白丹

苧麻根

三斤連葉

赤小豆

四升

右以水三斗煮浴日三四遍浸洗妙看冷熱避風

甘草散 治小兒丹毒防入腹

甘草

炙剉一分
為末 油麻半斤

右先取油麻去皮研細絞取汁一合調甘草末半錢
匕服日再服

青藍汁 治小兒丹毒

青藍汁

一竹漚
二分

右和勻空心溫服一合日晚再服以差為度

鯽魚塗方 治小兒丹毒徧身絳色

生鯽魚一頭 麻油二兩

右搗魚令細入油研勻塗丹上日三五度即差

梓木灰塗方 治小兒家火丹發如大指日長一寸偏着兩脇傍兩頰上

梓木白皮 蓼葉各一分

右燒灰研末以鷄子白調如糊塗之以差為度

猪槽泥塗方 治小兒烟火丹從身起

猪槽下泥一合 生麻油一兩

右和調如糊塗之以差為度

癰疽塗方 治小兒地竈丹從陰下起入踝骨上

癰竈搏

末

屋四角茅

燒灰各一兩

右和研勻細以新水調如糊塗丹乾即易之以差為度

戎鹽塗方 治小兒鬼火丹發兩臂赤起如李子及從

面上起

戎鹽

分一附子一枚

右燒過研細用雄鷄血調塗丹上日三五徧以差為度一方用雄黃半兩

雄黃塗方 治小兒野火丹發徧身斑如梅李狀

雌黃 戎鹽

研各一兩

右以鷄子白調塗丹上日三五次以差為度一方有雄黃無雌黃

猪通灰塗方 治小兒白丹

猪屎灰 鷄子白

右調和如糊塗之以差為度

茅灰塗方 治小兒火丹從踝及脛起

茅草

屋四角者
取燒研灰

鷄子白

右和調如糊塗之以差為度

拔毒散 治小兒發丹生於兩脅及腋下乃名殃火丹

川朴硝

一兩
兩 梔子仁

右羅為末每用半錢好醋調塗患處

山梔膏 治丹發生於兩脅及腋下乃名殃火丹

山梔子

四兩生 鯽魚半斤

右藥同搗如泥每用少許看丹發處以醋化塗患處

竹葉散

治小兒丹發斑斑如梅子徧背腹乃名野火

丹

青竹葉

二兩燒灰

竈中黃土

一兩

右細研為散看丹發處每用少許以鷄子白調塗患

處

赤豆散

治小兒丹發於兩膀裏尻間正赤流至陰處

乃名天灶火丹

赤小豆

研一分

伏龍肝

研一分

右再同研勻每用一錢以鷄子白調塗患處

二根湯 治小兒丹發膝上從兩股至臍間走入陰處

乃名尿灶火丹

桑根白皮

李子根

各四兩

右細剉每用三匙頭以水兩碗煎至一碗去滓着冷

熱避風處淋患處

硝石散 治小兒一切丹徧身體熱

硝石

一兩一分

右細研為散以鷄子白調塗之

又方

太陰玄精

一兩 白礬

一兩

右細研為散以調塗之

治小兒白丹方

酸母草 五葉草

各五兩

右搗絞取汁塗之

治小兒黑丹

風花石灰

二兩

屋四角茅草

三兩
燒灰

右細研為散以鷄子白調塗之日三五度効

治小兒天火丹發徧身赤如絳色

虎脂

二兩

黃丹

一兩

右研為膏塗之即差

治小兒鬼火丹

景天草

五蛇御草

右搗如泥以鷄血調塗之

治小兒野火丹

白殭蚕

二七枚

慎火草

一兩

右搗令爛塗之

治小兒螢火丹

竈中黃土

一合生油二合

右調如泥時用塗之以差為度若痛至陰不治即殺

人

治小兒癰竈火丹

赤小豆

末一兩

牛角

二兩燒灰

右細研為散用鷄子白調如泥塗之

治赤遊毒腫

用花藍石散生姜薄荷自然汁調鵝毛刷上患處此方尤妙於前白玉散行在潘術幹傳尤妙於前方只一晝夜消盡

治小兒丹毒及火丹熱如火遠腰者

用搗馬齒莧一握取汁飲之以滓傅其上亦可

又方

用煎大豆汁塗之良差後亦無瘢痕

又方

用臘月豬脂和釜下土傅乾則易

治小兒五色丹方

用猪槽下爛泥傅之乾則易

又方

服黃龍湯二合并傳患處佳

治小兒赤丹方

用藿藿葉搗取汁服三合滓傳上良千金翼以藿藿末用鷄子白和塗

治小兒赤丹斑駁者方

用唾和胡粉從外向內傳之一方粉熬過

又方

用鍛鐵屎以豬脂和傅之

又方

用屋塵以臘月豬脂和傅之

治小兒火丹赤如朱走皮中方

用醋和豉研傅之

又方

用鯉魚血傅之良

又方

用荏子搗傅之良亦治天火丹

又方

用猪米水和絞取汁溫服少許良

治小兒天火毒肉中有赤如丹色大者如手甚者遍身
或痛或痒腫方

用赤小豆二升為末鷄子白和如薄泥傅之乾則易
便差一切並用此方皆瘥一方用五合水和取汁飲
一合取滓塗五心一方水調鵝毛拂上大妙又有鷄

冠丹大者如豆粒肉上生粟一名茱萸火療同前天
火法

治小兒骨火毒其瘡見骨方

用搗大小蒜厚封之着足踝者是也

治小兒殃火丹毒着兩脇及腋下者方

用伏龍肝為末油和傅之乾則易若入腹及陰以慎
火草取汁服之

治小兒尿竈丹從兩股起及臍間走入陰頭皆色赤

用切桑白皮二升以水二升煮取汁浴之良

又方

用燒李根為灰以田中流水和之良一方半斤

治小兒朱田火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至
遍身如豆棗大正赤色者亦治茱萸丹五色丹

用濃者棗根汁洗之已成瘡者赤小豆末傅之未成
瘡者鷄子白和小豆末以傅之凡方中用鷄子者皆
取先破者用之完者無力

治小兒癰竈火丹初從足趺起正赤色者

用棗根煮汁沐浴五六度

治小兒丹毒

用白豆末水和傅之勿令乾

黃皮散 治小兒徧身火丹并赤遊

用黃皮山梔子等分為細末雪水調塗即差又方棗
豆大黃為末薄荷蜜水調塗又方藍澱塗之并藍青
汁飲之

獨効散 治小兒諸丹毒并赤遊腫

用栢枝研細塗立効又塗白礬汁頻刷之即消又方
以芒硝泡湯拭之亦効

治小兒丹毒腫痛如火

用土蜂窠為末入麝香少許蜜調塗之水調與喫尤
妙

治小兒丹毒入腹即殺人

用水苔生地黃生松葉豆葉葫蘆浮萍護火草五葉

藤苦硝海藻菜蕒臺大黃梔子黃芩但得一味研末水調傳之良

治小兒熱丹瘡成片及治大人

用系茅草葉破即愈

治小兒丹瘤

用草麻子五箇去皮研如麪以水一匙調塗之甚妙
又方

用木鱉子新者去殼研如泥淡醋調傳之一日三五

次便効

治急救丹毒方

用白扁豆末水和塗若入心腹者以慎火草取汁一盞服乾即末之水調服

本事方 治小兒十種丹瘤腫毒所起形候

一飛竈丹從頂起腫光用葱白研自然汁塗

二吉竈丹從頭上紅腫痛用赤小豆末鷄子清調

塗

三鬼火丹從面上起赤腫用竈心土末鷄子清調塗

四天火丹從背起赤點丹桑白皮末羊脂塗

五天竈丹從兩臂赤腫黃色用柳木燒灰水調塗

六水丹從兩脇虛腫用生鐵末猪糞調塗

七胡吹丹從臍上起黃腫用檳榔末米醋塗

八野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗

九烟火丹從兩角有赤白點猪槽下土清油調塗

十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗
右此十種丹毒變易非輕治之或緩終不能救余不
惜是方逐一子細辨認依方法治之萬不失一如經
三日不治攻入臟腑則終不可救治之也

治丹瘤方

用大黃朴硝大土蜂窠三味為末篋子箠定真赤
處將刀子刺破令出惡血然後用井水調塗赤處効
又方

用茅屋上經年青苔焙乾為末醋調塗赤腫處消

治小兒瘤初發

用麻子搗為漿并水調下

治小兒丹瘤

服托裏散消毒飲外用白芨白歛研為細末搽無病
肉上而截之令不得過却用紫浮萍爛研傅瘤上萬
不失一

治大人小兒纏蛇丹初發便用

用蚯蚓糞連皮生姜研爛傅即愈亦治火丹以水和泥傅之米醋調亦可

又方

用大黃為末搗爛馬齒莧取汁調塗已成丹亦治

又方

用蓼葉燒灰鷄子清和數數塗之

又方

用桃仁湯浸去皮爛搗塗之又清油調白礬末亦妙

治小兒風丹疹

用蜜調赤土硃入酒一二滴服之亦研塗疹上

治諸丹

用人參羌活散惺惺散夾和用竹葉煎湯調下熟證
加黃芩玄參冷證加黃耆白芷

疎風解毒散 治丹毒傳方

用紫浮萍一碗活地龍中等者七條同研細傳之

又方

用水藻搗傅

又方

用芭蕉根用汁傅之

又方

用蚕沙一升井水煎溫和密室洗之亦治天炷火丹

治青白丹毒痒痛虛腫如吹

用竈中黃土一分豉半分為末麻油調傅患處

蜈針法

用水蜚數條以青苔蓋覆或溫紙亦可去血即消未
消再用瘰癧毒滿身徧黑入腹入陰難治

平血飲 治風熱積毒聚成發於頭面手足熱者如腮
脂色其熱如火輕輕着手痛不可忍

右加紫草與犀角消毒飲相間煎服赤瘰丹火瘰紫
萍瘰並治壯熱煩渴甚加黃芩麥門冬去心朴硝各
半錢一方與敗毒散和生姜薄荷蟬蛻去足翼防風
去蘆細切煎渴加天花粉少許

治角瘳

用青黛土硃為末井水調入蜜敷角亦可

又方

用黃丹不拘多少磨刀水調刷

治丹毒腫如火

用大黃朴硝為末調塗腫處立効水苔生地黃松葉
浮萍梔子皆可研爛水調傅

洗方

用防風醋車前赤豆竈心土煎水洗

又方

洗角後用小驚丸壓邪大驚丸鎮驚

治丹發疼痛

用搗篇竹汁服一日一兩服立差若未差再服之

治赤白遊疹及癰腫毒腫

用水蛭十餘枚令啗病處取皮皺肉白無不差也冬
月無蛭虫地中掘取暖水中養之令動洗去人皮臍

以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者崔
知悌令兩京預養之以防緩急收乾蛭當展其身令
長腹中有子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子
烟薰三年得水猶活也

治小兒赤遊行於體上下至心即死方

用芒硝內湯中取濃汁以拭上又方以水調塗之治
一切丹毒流腫

治小兒丹毒破作瘡黃水出亦治惡瘡

用豉炒令烟絕為末油調傅之

治小兒丹毒

用柳葉一斤水一斗煮三升去滓搗洗赤處日七八度

治小兒赤丹不止

用番黃米粉鷄子白和傅之

治丹者惡毒之瘡五色無常

用蜜和乾薑末傅之良

治丹火毒偏身腫不可忍亦治赤流

用蔞蘿草搗絞取汁或搗傅上隨手消

治小兒熱毒遊腫

用故麻鞋草鞋和人亂髮燒作灰醋和傅之

治火丹毒

用梔子和水調傅之一方用醋和塗之亦治神火丹

治五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之

用敗蒲席燒灰和鷄子白傅之

治小兒赤遊行於體上下至心即死

用水中苔搗末傅上良

治暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結

用搗積雪草絞汁服之

治小兒丹毒皮膚熱赤

用寒水石半兩白土等分搗羅為末用米醋調傅之
愈

治白丹

用取白堊末猪脂和傅之

治小兒丹毒從臍起方

用伏龍肝是年深竈下黃土研為末用屋漏水和如糊
傅患處乾即易以差為度用新汲水調亦得一方用
鷄子白相和塗良

治天竈火丹風熱赤遊腫

用猪脂塗

治小兒赤遊行於體上下至心即死

用胡蘿蔔汁洗之一方搗葉傅之治丹毒五色者

治小兒油丹赤腫

用蕎麥麴醋和傅之良

療螢火丹從頭起

用慎火草搗和苦酒塗之

療煙火丹發從背起或兩脅及兩足赤如火

用景天草

即慎火草

真珠末一兩搗和如泥塗之

治小兒赤遊行於體上下至心即死

用慎火草生一握搗絞汁以拭之搨上日十遍夜三四遍

治小兒赤丹不止

用胡荽汁傅之差

療竈丹從兩脚赤如火遶

用五加葉根燒灰五兩取鍛鐵家槽中水和塗之

五色丹名油腫不可輕

用牛屎傅之乾則易

治赤丹

用研粟米傅之

治熱遊毒赤腫

用枯樓末二大兩醎醋調塗之

治小兒丹毒

用青黛和水服之又以汁傅之熱則易

治小兒遊瘤丹毒諸惡瘡腫

用爛搗剪刀草莖葉如泥傅之又以此草膏化如糊

以鷄翎掃上腫便消殊効根煮熟未甚乾時人作果子常食無毒

治小兒丹毒熱

用旋覆花根苗搗絞汁服之

治小兒風熱丹毒瘡

用水甘草同煎飲服之

又方

用杵菰菜傳之

治小兒火焰丹消赤腫

用老鴉眼睛草根與木通胡菜煎湯服通利小便

治小兒丹

用杵黃芩末水調傅之

香藥皮散 治諸腫丹毒發於四肢腹背頭面或赤或白或痒或痛或寒或熱

用香藥皮一兩水一大碗同煎取半碗以翎毛刷患處効

蟻螬散 治丹走皮中浸廣者入腹殺人用蟻螬乾者碾末油調塗之以差為度

泥醋塗方 治小兒胡吹竈丹從陰下起

用磨刀水棚下泥和醋調膏塗之乾即更塗以差為度

鐵槽水洗方 治小兒飛竈丹從項起

用浸槽中水日三五度又方飲一合治熱毒遊腫

大骨灰塗方 治小兒神火丹從項起

用犬枯骨為末以青羊脂調如糊塗之日三五次

治白丹鐵挑方

右於兒男左女右大脰脂面螺文上以鐵挑有筋斷之差

羊脂塗方 治小兒殃火丹從兩脅下起青黑色

用鍛鐵下槽中鐵屎搗研為末半兩羊脂二兩猪糞燒灰一兩同研如糊塗之以差為度

治小兒患赤白遊疹

用蝦蟆搗碎傅之煮熟色正赤小兒及鷄狗食之脚屈不行

治一切丹毒

用梔子大黃蜜水搗傅

治小兒一切丹徧身體熱

用浮萍草研如泥傅之

又方

用韭畦中土以水調塗之

又方

用粟米水者濃汁洗之

又方

用地龍煮以水研如泥塗之

治小兒一切丹及諸腫毒

用鼠粘子根洗去苗搗絞取汁每半合量兒大小分減服之

治小兒一切丹

用水苔搗爛頻頻傅之

又方

用景天草爛搗傅之一方取汁先微揩丹上後塗以差為度

治小兒丹發惡毒五色無常

用青粟毬有刺者搗碎以水煮洗之

治小兒五色丹徧身熱如火燒遶腰即損人

用藿藿子一兩以酒一小盞細研取汁塗之

治小兒火焰丹消赤腫

用老鴉眼睛草葉入醋細研傅

治小兒白丹

用蘭香葉搗爛塗之

又方

用蓼葉搗爛塗之

又方

用楸上塵以醋和塗之

用鹿角燒灰細研猪脂和塗之

治小兒面身卒得赤丹或痒或腫起不速療之即殺人
用羖羊角屑八兩以水五升煎至一升絹濾去滓入
煉了猪膏五兩和令勻傅之

治小兒赤丹

用菖勒蔓輕磨破以醋研訶梨勒塗之妙

治小兒黑丹

用青羊脂熟摩日三五度用之

又方

用喂猪杓子炙令熟熨之

治小兒天火丹發徧身赤如絳色

用鬼木搗絞汁塗赤處

又方

用小兒埋胞衣瓶子中水二合時時與兒服及塗身

上有毒處効

治小兒殃火丹生於脇腋下方

用川朴硝細研為散每服以竹漚調下半錢量兒大小加減服

又方

用伏龍肝細研以生油調塗之一方鷄子白和傅
又方

用浮萍草絞取汁時時與兒服之

治小兒神火丹

用鯽魚半斤赤小豆屑三合搗如泥塗丹上唯數塗
為良

治小兒朱田火丹

用鷄子白塗之

治小兒天竈火丹

用車前子末水調塗之

又方

用鐵落末以錫和如膏塗之

治小兒尿竈火丹

用屋四角茅燒灰細研為散以鷄子白調塗之

澤蘭湯

治丹入腹

方見本門風
癰癰瘡類

治天行煩毒小兒寒熱丹毒

用藍或青布水漬取汁飲之

拔毒膏 治小兒赤毒腫及腮頰腫痛

黃栢

兩一

寒水石

兩一

石膏

兩半

甘草

兩二

錢

黃芩

兩半

右為細末醋調成膏貼赤腫處或用新水調搽亦可

葛根白朮散 治一切赤白丹腫毒

白朮錢一
木香半錢
芍藥半錢
枳殼一錢半去穰麩炒
甘草

二錢 茯苓 三錢 葛根 三錢

三錢
去皮
葛根
三錢

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候量兒大小增減

土黃散 治赤流丹毒可用一小鋤刀疎去赤暈惡血
毒汁次用此藥

土硝一大黃一細錢

一細錢末

右二味相合新水調攪勻用鷄毛蘸時時塗掃

解肌散 治火丹

赤芍藥

二錢半

甘草

二錢

乾葛

一錢

麻黃

去節一錢

黃芩

一錢

升麻

二錢

右咬咀每服半錢桃柳條各七寸水六分盞同煎溫服如發熱氣壅宜先用虎睛丸麥煎散

人參散 治赤遊丹

人參

三錢

蟬退

十五个去足

羌活

二錢

防風

三錢

當歸

二錢

粉草

二錢 全蝎 十斤去毒 茯苓 三錢 紅花 三錢

右咬咀每服用燈心薄荷生地黃同煎

當歸散 治一切風丹火疹

赤芍藥 二錢 當歸 一錢 地黃 一錢 紫草 二錢 麻黃 一錢 羌活 一錢

一錢 桂皮 一錢 甘草 二錢

右為末每服一錢薄荷葉同煎

塗角藥

赤小豆 白藥子 天花粉 槐花 滑石 黃

皮拍寒水石等

右為末用生赤芍藥地黃藕節雪草搗汁塗患處即散

治丹毒未見面目或不當處不可角退

牡礪 青黛 豆粉等分

右為末用生地黃汁塗角調傅患處

又方

赤小豆 赤芍藥等分


右為末用鷄子清生地黃藕汁調塗傳患處

治小兒赤遊行體上下至心即死

以生景天草搗傳瘡上

治白遊赤遊

以死蠶塗之白遊用白死蠶塗赤遊用赤死蠶塗



普濟方卷四百六